



DEPOSICIÓN FRESCA

Aplicable para los siguientes exámenes: Leucocitos fecales, Test Pack Rotavirus, Azúcares reductores, Ph Fehling, Adenovirus, Hemorragias ocultas en deposición y Test Inmunológico Helicobacter Pylori.

Estimado paciente:

Su médico le ha indicado un examen que requiere de una muestra de Deposición Fresca. Este análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición.

En la Unidad de Toma de Muestras de Laboratorios Clínicos UC le entregarán un frasco limpio y seco. El examen requiere de una muestra de buena calidad, por lo tanto, lea las siguientes instrucciones hasta el final antes de tomar la muestra.

Recolección de la muestra:

1. Defeque en un recipiente limpio y seco (evite mezclar con orina).
2. Con una paleta de madera, tome una muestra de deposición del tamaño de una nuez. Si la deposición es líquida, tome el equivalente a 4 cucharaditas y colóquela en el frasco que se le entregó.
3. De preferencia obtenga la muestra de deposición del área que presente sangre o mucosidad.
4. Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración.

Si el paciente utiliza pañal siga las siguientes instrucciones:

- La muestra puede tomarse desde el pañal siempre que no esté mezclada con orina, cremas, aceites o talco.
- Con una paleta de madera, tome una muestra de deposición recién emitida del tamaño de una nuez. Si la deposición es líquida, tome el equivalente a 4 cucharaditas y colóquela en el frasco que se le entregó.
- De preferencia obtenga la muestra de deposición del área que presente sangre o mucosidad.
- Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración.

Traslado de la muestra:

Coloque el frasco con la muestra en una bolsa y amárrela. Luego, introduzca esto en otra bolsa que contenga hielo. Amarre bien la bolsa.

Lleve la muestra a la Unidad de Toma de Muestras antes de 1 hora de emitida la deposición